

核准日期：2007年11月22日

修改日期：2009年03月05日 2020年09月29日 2020年11月05日

仁康®

# 新霉素氟轻松乳膏说明书 外

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用  
对本品任何成份过敏者禁用

## 【药品名称】

通用名：新霉素氟轻松乳膏

英文名：Neomycin Sulfate and Fluocinonide Cream

汉语拼音：Xinmeisu Fuqingsong Rugao

【成份】本品为复方制剂，其组分为：每克含硫酸新霉素3500U、醋酸氟轻松0.25mg、冰片5mg。

【性状】本品为白色乳膏。

【适应症】用于过敏性皮炎、亚急性、慢性湿疹、阴囊湿疹、皮肤瘙痒症和外阴瘙痒等皮肤病。

【规格】每克含硫酸新霉素3500U；醋酸氟轻松0.25mg；冰片5mg。

【用法用量】外用。涂于皮肤患处，一日2~3次。

【不良反应】1.长期和大面积应用，可引起皮肤萎缩、毛细血管扩张、发生痤疮皮炎、口周皮炎、毛囊炎、增加感染的易感性等。

2.偶可引起变态反应性接触性皮炎。

【禁忌】1.对本品任何成份过敏者禁用。

2.眼部禁用。

【注意事项】1.本品不能长期、大面积应用。

2.应用于面部及皮肤皱褶部位应慎重权衡利弊。

3.新霉素与庆大霉素有交叉过敏。

4.本品性状发生改变时禁用。

5.儿童必须在成人监护下使用。

6.请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【孕妇及哺乳期妇女用药】1.孕妇及哺乳期妇女应权衡利弊后慎用。

2.孕妇不能长期、大面积或大量使用。

【儿童用药】儿童应尽可能减少药物用量、且不能采用封包治疗。

【老年用药】无参考文献说明。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】无参考文献说明。

【药理毒理】硫酸新霉素为氨基糖苷类抗生素。对需氧革兰阴性杆菌有强大的抗菌活性，对产碱杆菌属、莫拉菌属、枸橼酸菌属、不动杆菌属、布鲁菌属、嗜血杆菌属及分枝杆菌属等亦有一定的抗菌活性。醋酸氟轻松为合成的含氟强效糖皮质激素，外用可使真皮毛细血管收缩，抑制表皮细胞的增殖或再生。抑制结缔组织内纤维细胞的新生，稳定细胞内溶酶体膜，具有较强的抗炎及抗过敏的作用。冰片具有止痛、消肿作用。

【药代动力学】无参考文献说明。

【贮藏】密封，在阴凉处(不超过20℃)保存。

【包装】铝质药用软膏管装，20g/支。

【有效期】18个月

【执行标准】YBH02402007

【批准文号】国药准字H20064983

【药品上市许可持有人】桂林华信制药有限公司

【注册地址】广西桂林灵川县灵川镇灵北路一街89号

【生产企业】桂林华信制药有限公司

【生产地址】广西桂林灵川县灵川镇灵北路一街89号

【邮政编码】541299

【电话】0773-6818778 【传真】0773-6817722

如有问题可与生产企业直接联系